



# Los hongos

La tiña felina es una infección causada por un hongo que crece en zonas muertas y superficiales de la piel, del pelo y de las uñas. No es un problema vital para el animal, pero sí es pesado y es importante conocer algunas de sus particularidades.

**E**l nombre técnico es *dermatofitosis*, y los hongos productores del problema son los dermatofitos. En el caso de los gatos, en casi el 90% de los casos, el dermatofito responsable es *Microsporum canis*, que también puede afectar a perros y a humanos.

El contagio se produce a través de las esporas que producen los hongos; estas esporas se esparcen desde el animal infectado a otros seres vivos de su entorno, o a sus enseres (camas, cepillos, etc.). Cuando la piel está intacta y el animal goza de un buen estado sanitario, la transmisión del problema no es habitual, pero en casos de heridas, parásitos externos o bajadas de defensas por otras patologías, el contagio es más probable si existe un foco transmisor.

El problema es más frecuente en gatos de menos de un año y en ejemplares de pelo largo, en los que la patología se manifiesta con síntomas variables: Suelen aparecer lesiones circulares sin pelo (alopécicas),

principalmente en la cabeza, las orejas y las extremidades; los pelos que rodean la lesión suelen aparecer rotos y la piel descamada.

Para el diagnóstico no es suficiente con la valoración visual de las lesiones; el uso de la Lámpara de Wood, el examen microscópico de los pelos afectados o un cultivo fúngico nos darán un diagnóstico certero del problema.

En gatos sanos, la mayoría resuelve el problema en unas semanas sin necesidad de tratamiento, aunque suele ser recomendable tratarlo para evitar el riesgo de transmisión a otros animales y personas.

Los fármacos de elección pueden ser de uso sistémico (para todo el organismo), o tópicos, para la zona afectada; nunca apliquemos un tratamiento sin la prescripción del profesional, aunque estemos seguros de que la lesión es un hongo y que el tratamiento que tenemos en casa o el que nos recomiendan pueda ser efectivo.

En casos graves, con muchos animales, o en los que vuelve a repetirse el problema tras el tratamiento, suele ser muy importante la descontaminación del ambiente y de los objetos o accesorios de uso habitual. Lo que pueda ser desinfectado y descontaminado se tratará mediante aspiración profunda y utilizando desinfectantes que recomiende el profesional; después de este proceso se desecharán las bolsas de aspirador utilizadas, así como todos aquellos elementos que no puedan ser tratados. ■

“ El contagio se produce a través de las esporas que producen los hongos. ”

